

Velpanat Natco Pharma Ltd

(Велпатасвир и Софосбувир)



Инструкция по применению

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Препарат противовирусного действия

Препарат Velpanat – это комбинированное лекарство, которое имеет в составе два активных вещества Софосбувир и Велпатасвир. Препарат создан для препятствия развития вируса гепатита С в организме больного. Каждая таблетка содержит Велпатасвир (100 мг) и Софосбувир (400 мг), которые в комплексе являются сильно действующим средством направленного действия против вирусного гепатита С.

СОСТАВ

Активными вещества препарата Velpanat выступают:

- Софосбувир (400 мг);
- Велпатасвир (100 мг).

В состав входят вспомогательные вещества: стеарат магния, коповидон, микрокристаллическая целлюлоза, кроскармелоза натрия.

Каждая таблетка имеет плёночную оболочку, содержащую неактивные вещества: полиэтиленгликоль, диоксид титана, красный оксид железа, тальк и поливиниловый спирт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Velpanat создан для эффективного лечения гепатита С хронической формы 1,2,3,4,5,6 генотипов у совершенно летних больных, при наличии компенсированного цирроза или без него. В случае наличия декомпенсированного цирроза, терапия проводится в комплексе с Рибавирином.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат рекомендовано принимать по 1 таблетке в сутки, после приёма пищи или до еды. Больные при отсутствии цирроза или наличии компенсированного цирроза, проходят курс противовирусной терапии длительностью 3 месяца.

Больным гепатитом С при наличии декомпенсированного цирроза, рекомендовано комплексное лечение в течение 12 недель препаратами Velpanat и Рибавирина. Доза Рибавирина при комбинированном лечении рассчитывается индивидуально, исходя из веса пациента и принимается в два приёма:

- 1000 мг. в сутки для больных, вес которых не превышает 75 кг;
- 1200 мг в сутки для пациентов с весом, превышающим 75 кг.

В процессе лечения дозировка Рибавирина может измениться, что зависит от показателей креатининового клиренса и гемоглобина.

Лечение должен назначать только доктор, который устанавливает дозировку и корректирует её в процессе терапии, в случае приёма других медикаментов, мешающих действию активных веществ.

В случаях, когда при лечении возникают побочные эффекты средней и низкой степени тяжести, необходимо продолжить терапию по установленному режиму. Если побочные явления сильно выражены или лечение не приносит положительных результатов, его нужно прервать.

Velpanat рекомендовано принимать вместе с пищей, запивая водой, каждый день в одно время.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Нельзя принимать Velpanat пациентам, имеющим аллергию на любой из компонентов препарата. Комплексную терапию с применением Рибавирина, не используют для лечения гепатита С у лиц, имеющих противопоказания к приёму Рибавирина.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прежде чем начать лечение препаратом Velpanat, важно сообщить доктору о любых сопутствующих заболеваниях:

- болезнях печени, кроме ВГС;
- почечной недостаточности и прохождении гемодиализа;
- симптоматической брадикардии тяжёлой степени;
- беременности или подготовке к зачатию (при лечении женщинам нельзя беременеть в течение терапии и ещё полгода после прекращения приёма препарата, из-за его негативного влияния на плод);
- нельзя принимать препарат при лактации, из-за возможности его проникновения в организм ребёнка через грудное молоко матери.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Использование препарата не рекомендовано для больных, не достигших совершеннолетия. На данное время отсутствуют данные о влиянии Velpanat на детский организм.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В случае приёма более одной таблетки в сутки, пациент должен быть обследован, что поможет выявить интоксикацию организма. Если произошла передозировка, необходимо произвести поддерживающие организм меры, проследить за жизненно важными функциями и общим состоянием больного.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИКАМЕНТАМИ

Пациент должен сообщать доктору про приём любых препаратов во время лечения, включая витамины и пищевые добавки. Препарат может взаимодействовать с другими медикаментами,

поэтому важно предупреждать лечащего врача о начале или прекращении приёма любых лекарств. Нельзя принимать при лечении препаратом Velpanat другие лекарства, в составе которых содержится Софосбувир, Велпатаасвир, рифампицир, карбамезепин или зверобой. Любое из этих веществ снижает эффективность лечения, что происходит из-за уменьшения степени концентрации Софосбувира в организме пациента.

Обязательно проконсультируйтесь с доктором, при необходимости приёма медикаментов для лечения язвы желудка, кислотного рефлюкса и изжоги, таких как:

- Антицидные средства;
- Омепразол (ингибитор проточной помпы);
- Фамотидин (блокатор гистаминовых рецепторов).

Обязательно сообщите доктору о приёме таких медикаментов:

- Розувастатин;
- Аторвастатин;
- Дигоцин;
- Амиодарон;
- Тенофовир дизопроксил фумарат используемый при лечении ВИЧ.

При терапии гепатита С нельзя заниматься самолечением, любые медикаменты и витаминные комплексы может назначать только врач, учитывая общее состояние организма пациента.

ФОРМА ВЫПУСКА

Препарат Velpanat выпускается в таблетках, имеющих овальную форму и плёночную оболочку. Каждая таблетка имеет гравировку, с одной стороны – шестиконечная звезда, с другой – полоса деления. Лекарство помещено в пластиковую баночку с крышкой, имеющей механизм контроля первого открытия. Флакон содержит 28 таблеток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить препарат нужно в месте недоступном для детей, в оригинальном флаконе, при температуре не выше +30С.

СРОК ГОДНОСТИ

Препарат годен в течение 2 лет после выпуска. Дата изготовления и срок годности указаны на упаковке. После истечения срока годности, препарат нельзя использовать для лечения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Registered Office and
Corporate Headquarters
Natco House
Road No.2, Banjara Hills
Hyderabad-500 034, India

